lu le 31 mai 1792 Süe

lu pour la 2e fois le 5 juillet 1792.

observation sur un epanchement de sang
dans la poitrine.

dans le mois de juin 1786. je fus appellé pour voir le sieur xx. peintre, agé de 20 ans, demeurant rüe de larbre sec, pres celle bailleul, il venoit de recevoir ~~se donner~~ deux coups de couteaux à la poitrine, lun situé pres du sternum, au niveau de la mamelle, lautre au dessous et du côté gauche, les deux playes etoient obliques de dedans en dehors et du haut en bas, penetrant dans la cavité du torax. j'appliquay deux compresses sur le lieu blessé, soutenues du bandage de corps et le scapulaire, le malade fut saigné trois fois en douze heures.

le lendemain les signes de lepanchement se manifesterent. difficulté de respirer, ~~la~~ petitesse du pouls. sueurs froides. une chaleur brulante dans lhypocondre gauche, la tumefaction du ventre du même côté, &c.

La situation de la playe. son obliquité, un tampon de graisse qui en bouchoit lorifice, ne pouvoit permettre la sortie du sang epanché, telle situation quon eut donnée au malade. il n'y avoit pour toute ressource que loperation de lempieme. je la proposai. Mr. Süe professeur danatomie dans ces ecoles, fut appellé en consultation, Mr. son fils laccompagna, lincertitude ou nous etions de scavoir si lhemorragie interieure etoit arretée, le deffaut de succés que lon eprouve trop souvent dans ces operations, joint a la foiblesse du malade, firent balancer les consultants sur le parti à prendre, loperation fut pourtant decidée, et remise au lendemain. quatre saignées qui furent faites dans cet intervale, ne diminuerent point les accidents, le lundi a dix heures du matin je fis loperation en presence de ces messieurs.

lappareil etant preparé, le malade assis sur son lit, le tronc penché du côté droit, Mr. Süe fils voulut bien le tenir dans cette attitude.

ARC 47 n°37

je fis une incision, de deux pouce et demi detendue, dans le milieu de lespace compris entre lappendice xyphoide, et lepine, ~~trois travers de doigt au dessu~~ du rebord de lhypocondre gauche
entre deux cotes, les teguments et le muscle tres large du dos furent coupés ~~dan~~ par cette premiere incision, dans la seconde je coupai les muscles intercosteaux, et penetrai facilement dans la poitrine, sans craindre de blesser les poumons, dans ce meme instand les cotes se rapprocherent si fort lune de lautre; quelles ne laissoint presque aucun intervale. un sang noiratre et decomposé, sortit aussitot a grand flot, ~~je~~ nous le laissames sortir librement, jusques a la fin, ce qui peut aler a la quantité dune pinte.

aussitot la respiration devint plus libre, et le malade fut soulagé.
jappliquay sur la playe des compresses imbibées, soutenues par le bandage de corps, et fis coucher le malade sur la playe.
le lendemain le sang etoit sorti en si grande quantité, que le lit fut mouillé jusques aux matelas, jen fis sortir encore, par les diverses situations du malade, et par les mouvements de la respiration. jintroduisis a ce second pensement, une bandelete de linge effilée, dans la poitrine, et jappliquay sur la playe un large plumaceau, chargé dun digestif ordinaire.
lissue du sang diminua dans les pensements suivants,
linjection dune decoction dorge avec le miel rosat, poussée dans la poitrine, en facilitoit la sortie.
le sixieme jour de loperation, les matieres devinrent plus noiratres, et exaloit une odeur de gangrene. je substituai a linjection susdite celle faite avec le ~~qu~~ kina; qui produisit le meilheur effet.
la bandelete de linge, que jintroduisois a chaque pensement, ne fut supprimée, que le 36.eme jour, et louverture ne tarda pas a se fermer. le malade a été entierement gueri le 42.eme il a fait peu de temps apres le voyage de Rhome,

ce 31 mai 1792. Adorne

n.° 48.

donne une observation sur une transposition des visceres presente la piece anatomique